

EC 2 mg készlet radioaktív gyógyszerkészítményhez

- ▶ **Megújult radiofarmakon-készlet ^{99m}Tc jelzéshez**
- ▶ **Hatóanyag:** 2,0 mg etilén-dicisztein (EC)
- ▶ **Három ampullás gyógyszerkészítmény:** ^{99m}Tc -EC oldatos injekció „in situ” az „A”, „B” és „C” injekciós üveg (radioaktív készlet) tartalmának és a ^{99m}Tc -pertechnetát-eluátumnak az elegyítésével készítendő el a felhasználás helyén.
- ▶ **Javallat/Adagolás:**
 - ▶ A ^{99m}Tc -EC injekció javallott képalkotó, dinamikus vesevizsgálatok elvégzésére, kamerarenográfiához.
 - ▶ 90-120 MBq ^{99m}Tc -EC-injekció intravénás alkalmazásra, 70 kg átlagos testsúlyra vonatkoztatva.
 - ▶ Gyermekeknél és serdülőknél is alkalmazható, a beadandó aktivitásmennyiségek meghatározása az SPC szerint.
- ▶ **Az elkészítéshez használt nátrium-pertechnetát (^{99m}Tc) aktivitása:** 0,8 – 1,6 GBq
- ▶ **Az elkészítéshez használt nátrium-pertechnetát (^{99m}Tc) térfogata:** 2 ml
- ▶ **EC készlet:**
 - ▶ **felhasználhatósági időtartama:** 24 hónap
 - ▶ **tárolása:** hűtőszekrényben (2°C - 8°C)
- ▶ **^{99m}Tc -EC injekció:**
 - ▶ **felhasználhatósági időtartama:** a jelzés időpontjától számítva 8 óra
 - ▶ **tárolása:** legfeljebb 25°C-on tárolandó
- ▶ **Jelzés végrehajtása:** szobahőmérsékleten [nem szükséges forrásban lévő vízfürdő]
- ▶ **Kiszerelés:** doboz 4 jelzéshez szükséges mennyiséget, azaz 4 darab „A”, 4 darab „B” és 4 darab „C” injekciós üveget tartalmaz
- ▶ **Forgalombahozatali engedély:** OGYI-T-09141 **ATC kód:** V09CA

